

Devoir à rendre le 21/05/2026

Autour de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite

I Calcul de l'intégrale $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt :$

I Calcul de l'intégrale $I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt :$

On considère pour cela la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \int_0^1 \frac{e^{-(1+t^2)x}}{1+t^2} dt$

1. Calculez $f(0)$.

$$\text{On a } \boxed{f(0) = \frac{\pi}{4}}$$

2. Soit $x \geq 0$. Montrer que $\frac{\pi}{4}e^{-2x} \leq f(x) \leq \frac{\pi}{4}e^{-x}$.

Pour tout $t \in [0, 1], x \leq (1+t^2)x \leq 2x$ puis $\frac{e^{-2x}}{1+t^2} \leq \frac{e^{-(1+t^2)x}}{1+t^2} \leq \frac{e^{-x}}{1+t^2}$ donc $e^{-2x}f(0) \leq f(x) \leq e^{-x}f(0)$ i.e.

$$\boxed{\frac{\pi}{4}e^{-2x} \leq f(x) \leq \frac{\pi}{4}e^{-x}}$$

3. En déduire la limite de f en $+\infty$.

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, le théorème d'encadrement implique que

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.}$$

4. Prouver que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

Soit $x < 0$. Pour tout $t \in [0, 1], (1+t^2)x \leq x$ puis $\frac{e^{-(1+t^2)x}}{1+t^2} \geq \frac{e^{-x}}{1+t^2}$ donc $f(x) \geq e^{-x}f(0)$. Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, le théorème d'encadrement donne :

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.}$$

5. Soit $u \in \mathbb{R}$. Montrer que $0 \leq e^u - 1 - u \leq \frac{1}{2}e^u u^2$.

Soit $\phi : u \mapsto e^u - 1 - u$. La fonction ϕ est dérivable sur \mathbb{R} de dérivée $\phi' : u \mapsto e^u - 1$. Donc ϕ est décroissante sur \mathbb{R}^- et croissante sur \mathbb{R}^+ . Comme $\phi(0) = 0$, on en déduit que ϕ est positive sur \mathbb{R}^+ .

Soit $\psi : u \mapsto e^u - 1 - u - \frac{1}{2}u^2 e^u$. La fonction ψ est deux fois dérivable sur \mathbb{R} de dérivée seconde $\psi'' : u \mapsto e^u(-u^2/2 - 2u)$. Donc ψ' est décroissante sur \mathbb{R}^+ . Comme $\psi'(0) = 0$, on en déduit que ψ est décroissante sur \mathbb{R}^+ . Comme $\psi(0) = 0$, on en déduit que ψ est négative sur \mathbb{R} . Par conséquent

$$\boxed{\forall u \in \mathbb{R}^+, \quad 0 \leq e^u - 1 - u \leq \frac{1}{2}e^u u^2.}$$

Soit $g : u \mapsto e^u - 1 - u - \frac{1}{2}u^2 e^{-u}$. La fonction g est deux fois dérivable sur \mathbb{R} de dérivée seconde $g'' : u \mapsto e^{-u}(e^{2u} - 2 + 3u - u^2/2)$. Donc g'' est négative sur \mathbb{R}^- ($e^{2u} - 2 \leq -1$ et $3u - u^2/2 \leq 0$) donc g' est décroissante sur \mathbb{R}^- . Comme $g'(0) = 0$, on en déduit que g est croissante sur \mathbb{R}^- . Comme $g(0) = 0$, on en déduit que g est négative sur \mathbb{R}^- . Par conséquent

$$\boxed{\forall u \in \mathbb{R}^-, \quad 0 \leq e^u - 1 - u \leq \frac{1}{2}e^{-u} u^2.}$$

Remarque : cette inégalité est beaucoup plus facile à obtenir avec la formule de Taylor Lagrange.

6. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $h \in [-1, 1]$. En déduire que

$$\left| f(x+h) - f(x) + h \int_0^1 e^{-(1+t^2)x} dt \right| \leq \frac{2h^2}{3} e^{2|1-x|}$$

On a

$$f(x+h) - f(x) + h \int_0^1 e^{-(1+t^2)x} dt = \int_0^1 \left[\frac{e^{-(1+t^2)(x+h)}}{1+t^2} - \frac{e^{-(1+t^2)x}}{1+t^2} + h e^{-(1+t^2)x} \right] dt$$

Or, pour tout $t \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{e^{-(1+t^2)(x+h)}}{1+t^2} - \frac{e^{-(1+t^2)x}}{1+t^2} - h e^{-(1+t^2)x} \right| &= \left| \frac{e^{-(1+t^2)x}}{1+t^2} \right| \left| e^{-(1+t^2)h} - 1 + (1+t^2)h \right| \\ &\leq \frac{e^{-(1+t^2)x}}{1+t^2} \frac{1}{2} e^{(1+t^2)h} ((1+t^2)h)^2 \end{aligned}$$

Comme $(1+t^2)(h-x) \leq (1+t^2)(1-x) \leq (1+t^2)|1-x| \leq 2|1-x|$, on en déduit que

$$\left| \frac{e^{-(1+t^2)(x+h)}}{1+t^2} - \frac{e^{-(1+t^2)x}}{1+t^2} + h e^{-(1+t^2)x} \right| \leq \frac{h^2}{2} (1+t^2) e^{2|1-x|}$$

D'où :

$$\left| f(x+h) - f(x) + h \int_0^1 e^{-(1+t^2)x} dt \right| \leq \frac{h^2}{2} e^{2|1-x|} \int_0^1 (1+t^2) dt$$

soit

$$\left| f(x+h) - f(x) + h \int_0^1 e^{-(1+t^2)x} dt \right| \leq \frac{2h^2}{3} e^{2|1-x|}$$

7. En déduire que f est dérivable sur \mathbb{R} et donner l'expression de f' sous forme d'intégrale.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $h \in \mathbb{R}^*$, on a

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \int_0^1 e^{-(1+t^2)x} dt \right| \leq \frac{2h}{3} e^{2|1-x|}$$

donc

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \int_0^1 e^{-(1+t^2)x} dt = 0$$

i.e.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = - \int_0^1 e^{-(1+t^2)x} dt.$$

Par conséquent, f est dérivable en x et

$$f'(x) = - \int_0^1 e^{-(1+t^2)x} dt$$

8. Prouver que la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x^2) + \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$ est dérivable sur \mathbb{R} et déterminer sa dérivée.

Les fonctions f et $x \mapsto x^2$ sont dérivables sur \mathbb{R} donc la fonction $x \mapsto f(x^2)$ aussi.

La fonction $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur \mathbb{R} donc la fonction $x \mapsto \int_0^x e^{-t^2} dt$ est dérivable sur \mathbb{R} d'après le théorème fondamental de l'analyse.

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$g'(x) = 2x f'(x^2) + 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt = -2x \int_0^1 e^{-(1+t^2)x^2} dt + 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Or

$$\int_0^1 e^{-(1+t^2)x^2} dt = e^{-x^2} \int_0^1 e^{-(tx)^2} dt.$$

Si $x = 0$ alors $g'(0) = 0$. Si $x \neq 0$ alors on effectue le changement de variable $u = tx$ ce qui est possible car $u \mapsto \frac{u}{x}$ est de classe \mathcal{C}^1 et on obtient :

$$\int_0^1 e^{-(tx)^2} dt = \frac{1}{x} \int_0^x e^{-u^2} du.$$

Par suite :

$$g'(x) = -2x e^{-x^2} \frac{1}{x} \int_0^x e^{-u^2} du + 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt = 0$$

La fonction g est donc de dérivée nulle sur l'intervalle \mathbb{R} ce qui prouve que g est constante à sa valeur en 0 : $\frac{\pi}{4}$.

9. En déduire l'existence et la valeur de I .

Comme g et f admettent des limites en $+\infty$ égales respectivement à $\frac{\pi}{4}$ et 0,

la fonction $x \mapsto \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2$ aussi et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

Pour tout $x \geq 0$, on a $\int_0^x e^{-t^2} dt \geq 0$ donc

$$I = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

10. En déduire la valeur de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-x}^0 e^{-t^2} dt$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. La fonction $u \mapsto \sqrt{2}u$ est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} donc

$$\int_0^x e^{-t^2/2} dt = \int_0^{x/\sqrt{2}} e^{-u^2} \sqrt{2} du$$

Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-u^2} du = \sqrt{2} I$$

Comme la fonction $t \mapsto e^{-t^2/2}$ est paire, on en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2/2} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-x}^0 e^{-t^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

II Étude de la fonction $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^x e^{-t^2/2} dt :$

1. *Montrer que la fonction* $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^x e^{-t^2/2} dt$ *est bien définie sur* \mathbb{R} .

Soit $(x, A) \in \mathbb{R}$, la relation de Chasles donne

$$\int_{-A}^x e^{-t^2/2} dt = \int_{-A}^0 e^{-t^2/2} dt + \int_0^x e^{-t^2/2} dt$$

Ainsi, $F(x)$ est bien définie et $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\sqrt{\frac{\pi}{2}} + \int_0^x e^{-t^2/2} dt \right)$ i.e.

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt.$$

2. *Calculer* $F(0)$.

On a $F(0) = \frac{1}{2}$

3. *Montrer que* F *réalise une bijection de* \mathbb{R} *dans* $]0, 1[$. *On notera* G *sa réciproque.*

La fonction F est dérivable sur \mathbb{R} et pour tout réel x , $F'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} > 0$.

La fonction F est donc strictement croissante et réalise, d'après le théorème de la bijection continue, une bijection de \mathbb{R} dans $\left] \lim_{-\infty} F, \lim_{+\infty} F \right[$.

Or $\lim_{-\infty} F = \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{-x}^0 e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = 0$ et

$$\lim_{\infty} F = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

Donc F réalise une bijection de \mathbb{R} dans $]0, 1[$.

4. *Soit* $x \in \mathbb{R}$. *Exprimer* $F(-x)$ *en fonction de* $F(x)$.

Par définition

$$F(-x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{-x} e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$$

car la fonction $t \mapsto e^{-t^2/2}$ est paire. Donc

$$F(-x) = 1 - F(x)$$

5. *Soit* $y \in]0, 1[$. *Exprimer* $G(1 - y)$ *en fonction de* $G(y)$.

On a

$$G(1 - y) = G(1 - F(G(y))) = G(F(-G(y))) = -G(y)$$

6. *Tracer le graphe de* F *et* G .

7. *Soit* $x < 0$. *Montrer que* $\forall u \in]-\infty, x]$, on a $\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) h'(u) \leq e^{-u^2/2} \leq h'(u)$

où $h : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto -\frac{1}{x} e^{-x^2/2}$.

La fonction Soit $u \in]-\infty, x]$, on a

$$h'(u) = \left(\frac{1}{u^2} + 1\right) e^{-u^2/2} \geq e^{-u^2/2}$$

Comme $u \leq x < 0$, $x^2 \leq u^2$ donc $1 - \frac{1}{x^2} \leq 1 - \frac{1}{u^2} \leq \frac{1}{1 + \frac{1}{u^2}}$. Comme $f'(u) > 0$,

on a donc

$$\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) h'(u) \leq e^{-u^2/2} \leq h'(u)$$

8. *En déduire que, pour tout* $x < 0$, on a

$$-\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}} \leq F(x) \leq -\frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}$$

D'après la question précédente, pour tout $x < 0$ et $A > -x$, on a :

$$\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) (h(x) - h(-A)) \leq \int_{-A}^x e^{-u^2/2} du \leq (h(x) - h(-A))$$

Par croissance comparées, $\lim_{A \rightarrow +\infty} h(-A) = 0$ donc :

$$\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) h(x) \leq \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^x e^{-u^2/2} du \leq h(x)$$

i.e.

$$-\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}} \leq F(x) \leq -\frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}$$

9. *En déduire un équivalent de* F *en* $-\infty$ *puis de* $1 - F$ *en* $+\infty$.

Soit $x < 0$, on a

$$\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \leq F(x) \frac{-x\sqrt{2\pi}}{e^{-x^2/2}} \leq 1$$

Le théorème d'encadrement donne $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) \frac{-x\sqrt{2\pi}}{e^{-x^2/2}} = 1$ i.e.

$$F(x) \underset{-\infty}{\sim} -\frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}$$

Comme, pour tout x , $F(-x) = 1 - F(x)$, on a :

$$1 - F(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}}$$

10. *Trouver un équivalent de $\ln F$ en $-\infty$.*

Comme $F(x) = -\frac{e^{-x^2/2}}{x\sqrt{2\pi}} \left(1 + \underset{+\infty}{o}(1)\right)$,

$$\ln F(x) = \ln \left(e^{-x^2/2}\right) - \ln \left(x\sqrt{2\pi}\right) + \ln \left(1 + \underset{+\infty}{o}(1)\right)$$

Comme $\ln \left(x\sqrt{2\pi}\right) + \ln \left(1 + \underset{+\infty}{o}(1)\right) = \underset{+\infty}{o}(x^2)$, on a donc

$$\ln F(x) \underset{-\infty}{\sim} -\frac{x^2}{2}$$

11. *Donnez un équivalent de G en 0 et en 1.*

Comme $\lim_0 G = -\infty$, on a $\ln F(G(x)) \underset{0}{\sim} -\frac{G(x)^2}{2}$ i.e. $G(x)^2 \underset{0}{\sim} -2 \ln x$.

Comme G est négative au voisinage de $-\infty$, on a donc :

$$G(x) \underset{0}{\sim} -\sqrt{-2 \ln x}$$

Comme, pour tout x , $G(1-x) = -F(x)$, on a :

$$G(x) \underset{1}{\sim} \sqrt{-2 \ln(1-x)}$$